

HORNÍ KRAMOLÍN - OVESNÉ



Luční společenstva na lokalitě (1)

- * Zachovalé rašelinné louky a přechodová rašeliniště
- * Bohatý výskyt vzácných druhů rostlin
- * Typický biotop hnědáka chrastavcového

Lokalita leží v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les východně od obce Ovesné Kladruby. Tvoří jí plochá niva potoka, jenž z jihozápadu napájí vodárenskou Podhorní nádrž. Niva je sevřena mezi rozsáhlý lesní celek na severu a trať Karlovy Vary - Mariánské Lázně z jihu. Na východě přímo navazuje na pobřežní partii vodárenské nádrže. Již před vymezováním systému Natura 2000 bylo území pro své přírodní hodnoty připravováno k ochraně jako přírodní památka.

Většina plochy byla delší dobu neobhospodařována a tak zde došlo ke spontánnímu rozvoji rašelinné vegetace. V osmdesátých letech byla západní část silně poškozena melioracemi. V současnosti na většině plochy probíhá kosení dotované z tzv. agroenvironmentálních programů. Zařazení do tohoto programu však neumožňuje provádět tzv. mozaikovitě kosení, optimální pro vývoj hnědáka chrastavcového (*Euphydryas aurina*). Plánuje se proto urychlené přeřazení do vhodnějšího dotačního titulu.

Převládajícím biotopem území jsou střídavě vlhké bezkolencové louky, ostřicovo-mechová slatiniště a přechodová rašeliniště, jenž nabývají v centrální části charakteru vznikajícího vrchoviště.

Nejvzácnější rostlinou lokality je všivec bahenní (*Pedicularis palustris*), další vzácné druhy představují ostřice Davallova (*Carex davalliana*), ostřice blešní (*Carex pulicaris*), orchidej prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*), nápadný upolín evropský (*Trollius europaeus*), tolije bahenní (*Parnasia palustris*), hmyzožravá tučnice obecná (*Pinguicula vulgaris*). Významně se uplatňují suchopýry - suchopýr pochvatý (*Eriophorum vaginatum*) a suchopýr úzkolistý (*Eriophorum angustifolium*), jejichž bělavé hlávky utvářejí výrazný letní aspekt vegetace. V tomto období je lokalita pro cestující na sousedící trati nepřehlédnutelná. Nejvýznamnějším druhem fauny území je bezesporu hnědásek chrastavcový (*Euphydryas aurinia*). Na několika místech v polostínu náletových smrků si jeho housenky staví chuchvalcovitá hnízda ve svinutých listech živné rostliny čertkusy lučního (*Succisa pratensis*). Je jedinou rostlinou, kterou v našich podmínkách hnědásek konzumuje. Tento náročný druh motýla se vyskytuje v rámci České republiky již jen v Karlovarském kraji. Jedná se o druh chráněný i v rámci EU a zde je hlavním předmětem ochrany.

Důkladnější průzkum fauny lokality teprve probíhá, nechybí zde však řada dalších vzácností jako je ohrožená zmije obecná (*Vipera berus*) nebo bekasina otavní (*Galinago galinago*).