

# KRUŠNOHORSKÉ PLATÓ



Typická krušnohorská krajina (1)

- \* Rozsáhlá rašeliniště s unikátní květenou a zvířenou
- \* Hluboké horské smrčiny s roklemi a mokřady
- \* Zachovalé a květnaté horské louky
- \* Biotop vzácného střevlíka Menetriesova

Jedná se o rozsáhlé území rašelinných komplexů obklopených horskými smrkovými lesy a loukami ležící mezi Božím Darem a Kraslicemi v Krušných horách. Lokalita pokrývá zachovalé náhorní plató pohoří a zahrnuje většinu nejcennějších rašelinišť. Ta jsou v území hojná zejména díky vlhkému a chladnému klimatu. Lokalita se skládá z východní a západní části, které jsou oddělené údolím Blatenského potoka. Jádrové území východní části tvoří národní přírodní rezervace Božidarská rašeliniště, v centru západní části leží připravovaná národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště.

Rašeliniště se zde vyskytují ve formě přechodových rašelinišť s koberci rašeliničů a suchopýrů, drobných květnatých slatin nebo rozsáhlých vrchovišť pokrytých porosty borovice bažinné. Největší vrchoviště většinou zahrnují i otevřenou centrální část s rašelinnými jezírky.

Jezírka mají "bezdný" charakter, plytké dno tvoří jen zčásti rozložené rašeliničky, a proto není radno je využívat ke koupeli. Nejkrásněji jsou rašeliniště zbarvena z podzimu, kdy postupně zrající vegetace hraje mnoha odstínů od zelené a žluté k oranžové až hnědé barvě. Mezi nejvýznamnější vrchoviště patří Mrtvý rybník a Pod Špičákem u Božího Daru, Spáleníště u Bludné, Malé Jeřábí jezero u Jelení, Velký močál, Velké Jeřábí jezero, Volárna, Brumiště a Chaloupecké rašeliniště u Přebuze, Haar u Šindelové. Na rašeliništích žije řada vzácných živočichů, jmenujme vzácné střevlíky (*Carabus menetriesii*, *Carabus nitens*) nebo tetřeva hlušce. Specifické rostlinstvo rašelinišť reprezentují hmyzožravé rosnatky, keříčky klikvy, kyhanky nebo šichy a koberce rašeliničů, suchopýrů a ostřic.

Obvod rašelinišť většinou pokrývají velmi hodnotné porosty podmáčených a rašelinných smrčín, jejichž reprezentativnost a plošné zastoupení jsou v rámci České republiky srovnatelné jen se Šumavou. Bohužel až do současnosti byly tyto porosty z hospodářských důvodů intenzivně odvodňovány.

Hojně zastoupená v rámci lokality jsou i louky, typy na úživnějších stanovištích jsou nazývány jako louky trojštětové, typy chudých a mělkých půd se podle dominantního druhu trávy jmenují louky smilkové. Květnaté a podmáčené louky hostí řadu vzácných rostlin včetně vstavačovitých, jmenujme kropenáč vytrvalý, vstavač (prstnatec) Fuchsův, běloprstku bělavou, prhu chlumní - arniku nebo vratičku měsíční.